

### Liste der Veröffentlichungen

1. HANDKE, K. (1980): Ornithologische Bestandsaufnahmen - Programme, Methoden und Fehlerquellen. Mitt. 13 d. Lehrstuhls für Biogeographie der Universität des Saarlandes.
2. HANDKE, K. & U. (1980): Das Vorkommen der Schnatterente (*Anas strepera*) im NSG "Lampertheimer Altrhein" (1948-1978). Vogel u. Umwelt 1: 115-122.
3. HANDKE, K. (1981): Erste Ergebnisse einer Brutvogel-Rasterkartierung der Stadt Saarbrücken. Verh. Ges. Ökol. Berlin IX : 329-333.
4. HANDKE, K. & H. ELLENBERG (1981): Brutvögel Saarbrückens - Erste Ergebnisse einer Brutvogel-Rasterkartierung der Stadt Saarbrücken. 96 S.
5. HANDKE, K. (1982): Ergebnisse einer Siedlungsdichteuntersuchung der Brutvögel auf einer 52,5 ha großen Brachefläche in Saarbrücken, den St. Arnualer Wiesen. Faun.-flor. Notizen aus dem Saarland 14: 127-133.
6. HANDKE, K. (1982): Ergebnisse einjähriger Brutvogel-Untersuchungen in Hessens größtem Naturschutzgebiet - NSG "Kühkopf-Knoblochsau" (Kreis Groß-Gerau). Luscinia 44: 269-302.
7. HANDKE, K. & U. HANDKE (1982): Ergebnisse sechsjähriger Brutvogel-Bestandsaufnahmen im NSG "Lampertheimer Altrhein", Kreis Bergstraße (1974-1979). Vogel u. Umwelt 2: 72-124.
8. HANDKE, K. & U. HANDKE (1982): Die Avizönose einer oberrheinischen Agrarlandschaft. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 137-151.
9. HAASS, C., HANDKE, K. & U. HANDKE (1983): Ergebnisse zweijähriger Greifvogel-Bestandsaufnahmen (Winter/Sommer) in einer südhessischen Agrarlandschaft. Vogel u. Umwelt 2: 209-213.
10. HANDKE, K. & P. KALMUND (1983): Erste Ergebnisse einer Kartierung der Libellen (Odonata) im Raum Saarbrücken aus den Jahren 1981 und 1982. Faun.-flor. Notizen aus dem Saarland 15: 191-200.
11. HANDKE, K. & U. HANDKE (1984): Untersuchungen über das Wintervorkommen von Vögeln im NSG "Lampertheimer Altrhein" (Kreis Bergstraße). Vogel u. Umwelt 3: 63-72.
12. HANDKE, K. (1984): Erste Ergebnisse mehrjähriger Herbstzug-Planbeobachtungen in der nördlichen Oberrheinebene ("Lampertheimer Altrhein", Kreis Bergstraße). Vogel u. Umwelt 3: 33-39.
13. HANDKE, K. & K.-F. SCHREIBER (1985): Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf unterschiedlich gepflegten Parzellen einer Brachfläche im Taubergebiet. Münstersche Geogr. Arb. 20: 155-186.
14. HANDKE, K. & P. KALMUND (1986): Der Brutvogelbestand einer Hybridpappelkultur bei Münster. Charadrius 22: 185-191.
15. HANDKE, K. & P. PETERMANN (1986): Atlas der Vögel des Saarbrücker Raumes. Versuch einer ökologischen Bestandsaufnahme. Aus Natur u. Landschaft im Saarland, Sonderband, 437 S.
16. HANDKE, K., KALMUND, P. & A. DIDION (1986): Die Libellen des Saarbrücker Raumes. Libellula 5: 95-112.
17. HANDKE, K. (1988): Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf Brachen in Baden-Württemberg. Schr.R. des Lehrstuhls f. Landschaftsökologie an der Universität Münster, Heft 8, 169 S.
18. HANDKE, K. & U. HANDKE (1988): Zur Wasserwanzenfauna eines Flussmarschen-Gebietes bei Bremen (Niedervieland und Ochtumniederung). BSH Natur Special Report 5: 15-61.

19. LECKE, T., HANDKE, K., KUNDEL, W. & K.-F. SCHREIBER (1988): Landscape Ecology in the Field of conflict between nature conservation and future industrial settlements. Münstersche Geogr. Arbeiten 29: 201-206.
20. BERNHARDT, K.G. & K. HANDKE (1988): Bemerkenswerte Arthropodenfunde aus dem Emsland. Natur u. Heimat 48(4): 100-112.
21. DIDION, A. & K. HANDKE (1989): Zum Einfluss der Nutzung und Größe von Weihern und Teichen im Saarbrücker Raum auf die Artenvielfalt der Libellen. Natur u. Landschaft 64(1): 14-17.
22. BERNHARDT, K.G. & K. HANDKE (1989): Untersuchungen zur Erstbesiedlung von Bodenarthropodengemeinschaften (Col. Carabidae, Het. Saldidae) sandig-kiesiger Pionierstandorte im Emsland. Natur u. Landschaft 64(4): 146-152.
23. HANDKE, K. (1989): Ersthinweis des Sandohrwurms *Labidura riparia* Pall. am Ochtumsand bei Bremen (Kreis Wesermarsch). Beitr. Naturkunde Niedersachsen 42: 62-63.
24. DIDION, A., HANDKE, K. & P. KALMUND (1989): Die Gewässer im Bereich der Grube Heinitz - Lebensraum vieler gefährdeter Libellenarten. Faun.-flor. Notizen aus dem Saarland 19: 17-29.
25. HANDKE, K. & W. KUNDEL (1989): Zur Besiedlung neugeschaffener Ufer in der Wesermarsch durch Gefäßpflanzen- und Arthropoden-Gemeinschaften. Landschaft u. Stadt 21(2): 87-92.
26. HANDKE, K. & U. HANDKE (1989): Die Assel- und Tausendfüßerfauna eines Flussmarschengebietes bei Bremen (Isopoda, Myriopoda). Drosera 1: 23-30.
27. HANDKE, K. (1990): Auswirkungen von Ausgleichsmaßnahmen auf die Fauna eines Graben-Grünland-Gebietes bei Bremen unter besonderer Berücksichtigung der Vögel. Landschaft u. Stadt 22(4): 144-155.
28. HANDKE, K. (1990): Ergebnisse zoologischer Untersuchungen in einem Grünland-Graben-Gebiet der Wesermarsch (Bremen). Verh. Ges. Ökol. Osnabrück XIX: 132-143.
29. KÖHLER, M., HANDKE, K., KUNDEL, W. & K.-F. SCHREIBER (1992): Möglichkeiten und Grenzen der Eingriffsregelung am Beispiel von Bremen-Niedervieland. UVP-Report 6(4): 233-240.
30. HANDKE, K. (1992): Zur Ausbreitung von *Bembidion aeneum* GERM. (Col. Carabidae) in der Bremer Wesermarsch. Z. Ökologie u. Naturschutz 1: 72-74.
31. HANDKE, K. (1992): Die Bedeutung von unterschiedlich gepflegten Grünland-Brachen für die Fauna. Faun.-flor. Notizen Taubergrund 10: 3-63.
32. HANDKE, K.; KÖHLER, M.; KUNDEL, W. & K.-F. SCHREIBER (1992): Die Landschaftsökologische Forschungsstelle (LFB). Z. Ökologie u. Naturschutz 1: 156-157.
33. HANDKE, K. & U. HANDKE (1992): Die Heuschreckenfauna eines Flussmarschengebietes bei Bremen (Saltatoria). Abh. naturwiss. Ver. Bremen 42(1): 65-86.
34. HANDKE, K. (1993): Tierökologische Untersuchungen über Auswirkungen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem Graben-Grünland-Gebiet der Wesermarsch bei Bremen. Dissertation in der naturwissenschaftl. Fakultät d. Universität Münster. Arbeitsberichte Landschaftsökologie Münster 15: 142 S. + 115 S. Anhang.
35. HANDKE, K. (1993): Auswirkungen winterlicher Überstauungen auf die Fauna eines Grünland-Graben-Gebietes. Verh. Ges. Ökologie Zürich XXII: 57-64.
36. HANDKE, K. (1993): Zur Fauna von Uferzonen in einem Flussmarschgebiet der Wesermarsch. Symp. Bd. Biol. semiaquat. Lebensräume Solingen: 51-74.
37. HANDKE, K. (1993): Zur Fauna neu angelegter Gewässer im Niedervieland bei Bremen. Metel. Schr.R. Naturschutz 4: 201-216.

38. HANDKE, K. (1993): Zur Carabiden-Fauna von Hartholzauen eines südhessischen Altrheingebietes (NSG "Lampertheimer Altrhein"/Kreis Bergstraße). Verh. Westdt. Entomologentag Düsseldorf 1992: 41-50.
39. HANDKE, K. (1993): Zur Wasserkäferfauna eines Graben-Grünland-Gebietes der Wesermarsch (Bremen) - Hygrobiidae, Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae. Z. Ökol. Naturschutz 2(4): 213-222.
40. DÜLGE, R., ANDRETZKE, H., HANDKE, K., HELLBERND, L. & M. RODE (1994): Beurteilung nordwestdeutscher Feuchtgrünlandstandorte mit Hilfe von Laufkäfergesellschaften (Coleoptera: Carabidae). Natur u. Landschaft 69 (4): 148-156.
41. HANDKE, K. & U. HANDKE (1994): Zur Entwicklung einer renaturierten Flussmarschenlandschaft bei Bremen aus zoologischer Sicht (Brokhuchting/Niedervieland). Initiativen zum Umweltschutz 1: 146-163.
42. BERNHARDT, K.G.; HANDKE, K. & K.-F. SCHREIBER (1994): Revitalisierung einer Aue- Istzustandserfassung und Bewertung - Résumé der Vorsitzenden. Initiativen zum Umweltschutz 1: 433-435.
43. HANDKE, K. (1994): Untersuchungen zur Gewässerfauna in einer Agrarlandschaft bei Großenkneten/Landkreis Oldenburg (Odonata, Heteroptera, Coleoptera). Beitr. Naturkunde Niedersachsen 47: 62-71.
44. SCHREIBER, K.-F., HANDKE, K., KÖHLER, M. & W. KUNDEL (1994): Gräben in der Bremer Wesermarsch - Bedeutung - Gefährdung - Schutz/Entwicklung. Hohenheimer Umwelttagung 26: 325-328.
45. BERNHARDT, K.G. & K. HANDKE (1995): Ein Beitrag zur Vegetation und Arthropodenfauna einer großen Abgrabungsfläche "Laerheide" bei Bad Laer (Heteroptera, Coleoptera). Braunschw. naturkd. Schr. 136: 181-195.
46. HANDKE, K. (1994/95): Brutvogelbestandsentwicklungen in einem Feuchtgrünlandgebiet der Wesermarsch- eine Zwischenbilanz sechs Jahre nach Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen. Der Falke 41(12): 402-416 u. 42(1): 22-28.
47. HANDKE, K. (1995): Zur Fauna von Schlickspülflächen in der Bremer Flussmarsch. Beitr. Naturkunde Niedersachsen 48(1): 23-43.
48. HANDKE, K. & K. MENKE (1995): Zur Laufkäferfauna von Röhricht- und Brachflächen in der Bremer Flussmarsch. Naturschutz und Landschaftsplanung 27(3): 106-113.
49. HANDKE, K. (1995): Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) und Blaukehlchen (*Luscinia svecica*) in der Bremer Wesermarsch (Niedervieland, Ochtumniederung und Ochtumsand). Der Falke 42: 245-248.
50. KUNDEL, W., HANDKE, K. & C. ZÖCKLER (1995): Das Leitbild für Schutz, Pflege und Gestaltung der Bremer Niederungslandschaft aus naturschutzfachlicher Sicht. Naturschutz u. Landschaftspflege 27: 218-226.
51. HANDKE, K. (1995): Zur Laufkäferfauna einer Bremer Flussmarsch. Ökologie u. Naturschutz 4(4): 203-225.
52. HANDKE, K. & H. MÜLLER (1995): Die Brutvögel des Ochtumsandes (Landkreis Wesermarsch). Beitr. Vogelkunde Niedersachsen 27(2): 57-64.
53. HANDKE, K. (1995): Zur Blattkäferfauna eines Norddeutschen Flussmarschengebietes. Drosera 95(2): 145-153.
54. HANDKE, K. & K. MENKE (1995): Die Laufkäferfauna der Bremer Flussmarschen: Ochtumniederung, Niedervieland und Werderland. Mitt. Dt. Ges. Allg. Angew. Ent. 10: 397-400.
55. HANDKE, K. (1995): Bedeutung von neugeschaffenen Überschwemmungsflächen für Rast- und Brutvögel. "Feuchtgrünland und Naturschutz". NNA-Berichte 8(2): 64-81.

56. EIKHORST, W. & K. HANDKE (1996): Methodik der Brutvogel-Erfassung im Feuchtgrünlandgürtel um Bremen. Bremer Beiträge f. Naturkunde u. Naturschutz 1: 27-35.
57. HANDKE, K. & W. EIKHORST (1996): Ganzjährige Erfassung aller Vogelarten - Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel von Niedervieland und Wümmewiesen. Bremer Beiträge f. Naturkunde u. Naturschutz 1: 37-50.
58. HILDEBRANDT, J. & K. HANDKE (1996): Biotoptypen des Grünlandes und deren Wirbellosenfauna - Versuch einer Zuordnung für den Bremer Raum. Bremer Beiträge f. Naturkunde u. Naturschutz 1: 83-94.
59. HANDKE, K., HILDEBRANDT, J. & W. KUNDEL (1996): Grünlanduntersuchungen im Bremer Raum - ein Résumé. Bremer Beiträge f. Naturkunde u. Naturschutz 1: 95-97.
60. HANDKE, K. & W. KUNDEL (1996): Veränderungen der Vegetation und Fauna auf überstauten Grünlandflächen im Niedervieland - Ergebnisse sechsjähriger Untersuchungen im GVZ-Ausgleichsraum. Bremer Beiträge f. Naturkunde u. Naturschutz 1: 179-188.
61. HANDKE, K. & K. MENKE (1996): Ergebnisse von Eklektor-Untersuchungen auf Grünlandflächen im Niedervieland unter besonderer Berücksichtigung überstauter Flächen. Bremer Beiträge f. Naturkunde u. Naturschutz 1: 189-196.
62. HANDKE, K. (1996): Bestandsentwicklung der Brutvögel eines Flussmarschengebietes bei Bremen. Vogelwelt 117(1): 15-28.
63. HANDKE, K. (1996): Zur Bestandssituation ausgewählter Wiesenvogelarten in der Bremer Flußmarsch (Kiebitz *Vanellus vanellus*, Uferschnepfe *Limosa limosa*, Rotschenkel *Tringa totanus*). Naturschutz u. Landschaftspf. 28 (4): 118-121.
64. HANDKE, K. (1996) : Die Bedeutung tierökologischer Untersuchungen für die angewandte Landschaftsökologie. Arbeiten aus dem Institut f. Landschaftsökologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Bd. 2: 93-112.
65. HANDKE, K. & P. HANDKE (1996): Die Bedeutung des Ochtumsandes für den Naturschutz. Arbeiten aus dem Institut f. Landschaftsökologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Bd. 2: 245-260.
66. HANDKE, K. (1996): Die Laufkäferfauna des Naturschutzgebietes Lampertheimer Altrhein in der südhessischen Oberrheinebene (Kreis Bergstraße). Decheniana 149: 139-160.
67. HANDKE, K. (1996): Die Avizönose eines strukturreichen Gehölz-Röhricht-Komplexes in der Wesermarsch bei Bremen (Polder Alte Ochtum). Beiträge Vogelkunde. Niedersachsen 28 (1): 31-43.
68. HANDKE, K.; KUNDEL, W. & M. RIESNER-KABUS (1996): 12jährige Erfahrungen und Erfolgskontrollen bei der Eingriffsregelung in der Bremer Wesermarsch. UVP-Report 5: 202-207.
69. KUNDEL, W. & K. HANDKE (1997): Vegetation und Fauna tidebeeinflusster Renaturierungsflächen in der Bremer Flussmarsch. Bremer Beiträge f. Naturkunde u. Naturschutz 3: 63-76.
70. HANDKE, K. & J. SEITZ (1997): Ein Cistensänger *Cisticola juncidis* in Norddeutschland. Limicola 11: 26-29.
71. HANDKE, K. (1997): Die Laufkäferfauna (Coleoptera. Carabidae) von Brachen und unterschiedlich genutzten Salzwiesen am östlichen Jadebusen. Faun.- Ökol. Mitt. 7: 197-211.
72. HANDKE, K. (1997): Zur Wirbellosenfauna regelmäßig gebrannter Brachflächen in Baden-Württemberg 1983/84. NNA-Berichte 5: 72-81.
73. HANDKE, K. (1997): Zur Laufkäferfauna extrem lang überstauter Grünlandstandorte in der Bremer Flussmarsch (Coleoptera: Carabidae). Verh. Westdt. Entom. Tag 1995: 29-36.

74. HANDKE, K. (1997): Natur- oder Kulturlandschaft – ein Beitrag zur Leitbilddiskussion in der Bremer Flussmarsch aus tierökologischer Sicht. Schr.R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz 54: 93-108. BFN, Bonn-Bad Godesberg.
75. HANDKE, K. (1997): Einsatz von Laufkäferuntersuchungen bei der Erfolgskontrolle in der Bremer Flussmarsch. Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent. 11: 57-62.
76. HANDKE, K. (1997): Auswirkungen von Überstauungsmaßnahmen auf Wirbellose in der Bremer Flussmarsch – eine Bilanz 10jähriger Untersuchungen. Arbeitsberichte Landschaftsökologie Münster 18: 77-112.
77. HILDEBRANDT, J. & K. HANDKE (1997): Überflutungen und Wirbellose – eine Einführung. Arbeitsberichte Landschaftsökologie Münster 18: 9-13.
78. HILDEBRANDT, J.; HANDKE, K. & A. MEIßNER (1997): Wirbellose und Überflutungen – ein Résumé. Arbeitsberichte Landschaftsökologie Münster 18: 307-316.
79. BERNHARDT, K.-G. & K. HANDKE (1998): Zur Wanzenfauna eines Flussmarschengebietes bei Bremen (Niedervieland, Ochtumniederung) Heteroptera. Abh. Naturwiss. Ver. Bremen 44(1): 75-91.
80. HANDKE, K. (1998): Bedeutung raum-zeitlicher Dynamik für die Fauna. Eine Bewertung am Beispiel der Bremer Flussmarsch. Naturschutz und Landschaftsplanung 30(8/9): 268-274.
81. HANDKE, K. (1998): Feuchtgrünlandmanagement in der Wesermarsch im Niedervieland bei Bremen.- 4. Auswirkungen der Überstauung auf die Fauna. Mitt. Deutsch. Bodenkdl. Ges. 88: 91-94.
82. HANDKE, K. & K.-G. BERNHARDT (1999): Ein neues Vorkommen von *Graphoderus austriacus* (STURM 1834) in Norddeutschland (Coleoptera: Dytiscidae). Beiträge Naturkunde Niedersachsen 52: 16-18.
83. HANDKE, K.; HANDKE, P. & K. MENKE (1999): Ornithologische Bestandsaufnahmen im Bereich des Windparks Cuxhaven in Nordholz 1996/97. Bremer Beiträge f. Naturkunde u. Naturschutz 4: 71-80.
84. BACH, L.; HANDKE, K. & F. SINNING (1999): Einfluss von Windenergieanlagen auf die Verteilung von Brut- und Rastvögeln in Nordwest-Deutschland. Erste Auswertungen verschiedener Untersuchungen. Bremer Beiträge f. Naturkunde u. Naturschutz 4: 107-121.
85. EIKHORST, W. & K. HANDKE (1999): Empfehlungen zu Rastvogelerhebungen bei Windparkplanungen – Erfahrungen aus dem Bremer Becken am Beispiel von Kiebitz (*Vanellus vanellus*) und Pfeifente (*Anas penelope*). Bremer Beiträge f. Naturkunde u. Naturschutz 4: 123-142.
86. HANDKE, K. (1999): Zur Bedeutung dynamischer Lebensräume für die Fauna am Beispiel der Bremer Flussmarsch. Mitt. NNA 1: 101-117.
87. HANDKE, K. (1999): „Gräben“. In: KONOLD, W., BÖCKER, R., HAMPICKE, U. (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege: Kap. XIII-7.15.2: 1-15. Ecomed-Verlag, Landsberg am Lech.
88. HANDKE, K. (1999): Auswirkungen zehnjähriger Vernässungs- und Extensivierungsmaßnahmen auf die Fauna. Ergebnisse von Begleituntersuchungen in einem Flussmarschengebiet bei Bremen. LÖBF-Mitt. 3: 67-73.
89. HANDKE, K., KUNDEL, W., MÜLLER, H.U., RIESNER-KABUS, M. & K.-F. SCHREIBER (1999): Erfolgskontrolle zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für das Güterverkehrszentrum Bremen in der Wesermarsch. 10 Jahre Begleituntersuchungen zu Grünlandextensivierung, Vernässung und Gewässerneuanlagen. Arbeitsberichte Landschaftsökologie Münster Heft 19. Textband 445 S. + 167 S. Anhang.
90. HANDKE, K. (1999): Die Brutvögel der Ochtumniederung im Zeitraum 1986 bis 1998 (Stadt Delmenhorst, Landkreis Wesermarsch). Vogelkundliche Berichte Niedersachsen 31(2):75-86.

91. GROTJAHN, F. & K. HANDKE (2000): Veränderungen der Heuschreckenfauna der Bremer Flussmarschen 1986 bis 1997. *Naturschutz u. Landschaftsplanung* 32(4): 97-105.
92. HANDKE, K. (2000): Vögel und Windkraft im Nordwesten Deutschlands. *LÖBF-Mitt.* 2:47-55.
93. HANDKE, K. (2000): Veränderungen in der Insektenfauna der Bremer Flussmarschen 1982-1999 – Zeichen eines Klimawandels? *NNA-Ber.* 13(2): 37-54.
94. BRÄUNICKE, M., HANDKE, K., PAILL, W., PERSONH, M. & J. TRAUTNER (2000): Aktueller Arbeitsstand zur Einrichtung eines „Seltenheiten-Ausschusses“ der GAC. *Angewandte Carabidologie* (2/3): 103-108.
95. HANDKE, K., HELLBERG, F. (2001): Programm zur Erfassung der Arten- und Lebensgemeinschaften in Bremen. Entwicklung eines Zielartenkonzeptes für Bremen als Grundlage für eine Bewertung und ein Grundmonitoring im Naturschutz und Konzept für ein Grundmonitoring im Bremer Naturschutz. Gutachten i.A. des Senators für Bau und Umwelt, Abteilung Naturschutz.
96. ADENA, J. & K. HANDKE (2001): Die Libellenfauna von Grünland-Grabensystemen im Bremer Raum. *Bremer Beiträge f. Naturkunde u. Naturschutz* 5: 91-103.
97. HANDKE, K. (2001): Die terrestrische Fauna von Gräben und Kleingewässern in der Bremer Flussmarsch. *Bremer Beiträge f. Naturkunde u. Naturschutz* 5: 117-127.
98. HANDKE, K. & J. ADENA (2001): Zur Fauna neu angelegter Gewässer in der Bremer Flussmarsch unter besonderer Berücksichtigung der Libellen. *Bremer Beiträge f. Naturkunde u. Naturschutz* 5: 175-188.
99. HANDKE, K. & P. HANDKE (2001): Zur Brutvogelfauna unterschiedlich strukturierter Hecken in einer nordwestdeutschen Agrarlandschaft (Großenkneten, Landkreis Oldenburg). *Jahresber. Ornithol. Arbeitsgem. Oldenburg* 16: 117-126.
100. SCHUSTER, H.-W. & K. HANDKE (2001): Beobachtungen am Brutplatz des Steppenschlammfläufers *Limnodromus semipalmatus* am Baikalsee. *Limicola* 15: 105-115.
101. HANDKE, K. & A. BELLMANN (2001): Die Rüsselkäferfauna (Coleoptera: Curculionidae) eines norddeutschen Flussmarschengebietes (Niedervieland/ Ochtumniederung/ Ochtumsand) – Ergebnisse von Erfolgskontrollen und faunistisch-ökologischen Bestandsaufnahmen. *Faun.-Ökol. Mitt.* 8: 107-143.
102. HANDKE, K. (2001): Auswirkungen der Beweidung auf die Fauna norddeutscher Grünlandflächen – eine kurze Übersicht. *NZH Akademie-Berichte* 2: 69-82. Wetzlar.
103. HANDKE, K. (2001): Zur Fauna beweideter Flächen in einem nordwestdeutschen Flussmarschengebiet (Niedervieland/Werderland/Ochtumniederung) – Feuchtgrünland – Deiche - Grabenränder. *NZH Akademie-Berichte* 2: 115-152. Wetzlar.
104. ERBER, C., FELIX-HENNINGSSEN, P., HANDKE, K., KUNDEL, W. & K.-F. SCHREIBER (2002): Management of moist grassland in a fresh-water marsh of the Weser River: effects on soil, vegetation and fauna. In: BROLL, G., MERBACH, W. & E.-M. PFEIFFER (Hrsg.): *Wetlands in Central Europe. Soil organisms, soil ecological processes and trace gas emissions*: 71-98. Springer.
105. AßMANN, T.; DORMANN, W.; FRÄMBS, H.; GÜRLICH, S.; HANDKE, K.; HUK, T.; SPRICK, P. & H. TERLUTTER (2003): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Sandlaufkäfer und Laufkäfer (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae) mit Gesamtartenverzeichnis. 1. Fassung vom 1.6.2002. *Inform.d. Naturschutz Nieders.* 23 (2): 70-95. Hildesheim.
106. HANDKE, K. (2004): Zur Fauna von Wiesen. Herkunft, Bedeutung, Veränderungen und Pflege – ein Erfahrungsbericht aus Deutschland. In: ARMERDING, D. (Hrsg.): *Schutz und Pflege der Wienerwaldwiesen 2004*. Fachtagung in Purkersdorf, 6. Mai 2004: 19-27.
107. HANDKE, K., ADENA, J., HANDKE, P. & M. SPRÖTGE (2004): Räumliche Verteilung ausgewählter Brut- und Rastvogelarten in Bezug auf vorhandene Windenergieanlagen in

- einem Bereich der küstennahen Krummhörn (Groothusen/Ostfriesland). Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 7: 11-46.
108. HANDKE, K., ADENA, J., HANDKE, P. & M. SPRÖTGE (2004): Einfluss von Windenergieanlagen auf die Verteilung ausgewählter Brut- und Rastvogelarten in einem Bereich der Krummhörn (Jennelt/Ostfriesland). Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 7: 47-59.
109. HANDKE, K., ADENA, J., HANDKE, P. & M. SPRÖTGE (2004): Untersuchungen zum Vorkommen von Kiebitz (*Vanellus vanellus*) und Großem Brachvogel (*Numenius arquata*) vor und nach Errichtung von Windenergieanlagen in einem Gebiet im Emsland. Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 7: 61-67.
110. HANDKE, K., ADENA, J., HANDKE, P. & M. SPRÖTGE (2004): Untersuchungen an ausgewählten Brutvogelarten nach Errichtung eines Windparks im Bereich der Stader Geest (Landkreis Rotenburg/Wümme und Stade). Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 7: 69-76.
111. REICHENBACH, M., HANDKE, K. & F. SINNING (2004): Der Stand des Wissens zur Empfindlichkeit von Vogelarten gegenüber Störungswirkungen von Windenergieanlagen. Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 7: 229-243.
112. HANDKE, K. (2005): Lebensgemeinschaften des Grünlandes als Spiegelbild der Nutzung – dargestellt am Beispiele von Wirbellosen und Lurchen. In: BRICKWEDDE, F., FUELLHAAS, U., STOCK, R., WACHENDÖRFER, V. & W. WAHMHOFF: Landnutzung im Wandel – Chance oder Risiko für den Naturschutz. Tagungsband der 10. Internationale Sommerakademie St. Marienthal: 359-370.
113. BERNHARDT, K.-G., HANDKE, K., KOCH, M., LAUBHANN, D., BERG, H.-M., DUDA, M., HÖTTINGER, H., KLEPSCH, R., PINTAR, M. & H. SCHEDL (2005): Anwendungsmöglichkeit eines Zielartenkonzepts in einem niederösterreichischen Weinbaugebiet. Pflege und Erhalt von Weinbergsböschungen. Naturschutz und Landschaftsplanung 37(7): 202-211.
114. HANDKE, K. (2004): Laufkäferuntersuchungen mit Eklektoren – Erste Ergebnisse aus der Bremer Flussmarsch. Angewandte Carabidologie 6: 29-41.
115. HANDKE, K., ADENA, J. & P. HANDKE (2006): Landschaftsökologische Untersuchungen auf dem Golfplatz Achim (Niedersachsen). Naturschutz & Landschaftsplanung 38(7): 214-224.
116. HANDKE, K. & M. REICHENBACH (2006): Nationale und internationale methodische Anforderungen an die Erfassung von Vögeln für Windparkplanungen – Erfahrungen und Empfehlungen. Beitrag zur Tagung „Windenergie – neue Entwicklungen, Repowering und Naturschutz“, 31.3.2006. [www.arsu.de](http://www.arsu.de)
117. DONATH, T.W., BISSELS, S., HANDKE, K., HARNISCH, M., HÖLZEL, N. & A. OTTE (2006): E + E-Vorhaben „Stromtalwiesen“ - Renaturierung von Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein durch Mahdgutübertragung. Natur und Landschaft 81(11): 529-535.
118. HÖLZEL, N., BISSELS, S., DONATH, T.W., HANDKE, K., HARNISCH, M. & A. OTTE (2006): Renaturierung von Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein. Ergebnisse eines E+E-Vorhabens des Bundesamtes für Naturschutz. 261 S.
119. HANDKE, K. & F. HELLBERG (2007): Entwicklung eines Zielartenkonzeptes für Bremen als Grundlage für ein Naturschutzmonitoring. Naturschutz und Landschaftsplanung 39(2): 37-45.
120. HANDKE, K. & P. HANDKE (2008): Es gibt viel zu sehen! Artenreiche Tierwelt im Süden der Gemeinde Ganderkesee. Ergebnisse der Kartierung von Vögeln, Libellen, Heuschrecken, Lurchen und Kriechtieren im Vereinsgebiet des Fuhrenkamp-Schutzvereins e.V., Selbstverlag, 129 S.
121. HANDKE, K. (2008): Renaturierung von Feuchtgebieten im Unterweserraum – Versuch einer Bilanzierung für Brut- und Gastvögel nach 20 Jahren. Vogelwarte 46(4): 278-279.

122. HANDKE, K., KUNZE, K., NAGLER, A., TESCH, A. & A. THEILEN (2010): Das Integrierte Erfassungsprogramm Bremen – Ansätze zur Bündelung und Optimierung von Kartierungen für den Naturschutz. Naturschutz und Biologische Vielfalt (BfN) 83: 197-209.